



MederiLab®

FORTE SPRAY

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-078

Spray
Ectoparasitocida

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Permetrina 2.7 g
Vehículo c.b.p.....100 ml

ESPECIES:



INDICACIONES:

Indicado para el control y prevención de infestaciones ocasionadas por pulgas (*Ctenocephalides spp*, *Pulex irritans*), ácaros (*Sarcoptes scabiei*, *Psoroptes spp*, *Demodex spp*, *Ácaro rojo*), piojos y malófagos. Tienen actividad repelente.

MECANISMO DE ACCION:

Su actividad se ejerce tanto en los parásitos adultos como en sus huevecillos. Por ser liposoluble, tiene capacidad de penetrar las áreas grasas de los insectos, lo que produce un efecto de choque inmediato. La permetrina actúa como una neurotoxina que despolariza la membrana celular nerviosa en el parásito. Rompe los canales de sodio, por medio de los cuales la membrana celular es regulada. La repolarización retardada da como resultado una parálisis de los nervios de los músculos exoesqueléticos respiratorios del parásito provocando su muerte. Ejerce su efecto ovicida evitando su eclosión. Mantiene un efecto residual hasta cuatro semanas después de su aplicación.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

El metabolismo de la Permetrina en los parásitos se realiza por separación del grupo éster formándose el ácido y el alcohol correspondiente. La parte ácida puede pasar a lactona o formar un derivado hidroxilado, en tanto que el alcohol puede pasar al aldehído.

Tras la aplicación tópica en el animal, las concentraciones sanguíneas de permetrina fueron indetectables. Los residuos más altos se encontraron en piel en el lugar de la aplicación. Mientras la molécula de Permetrina se mantiene protegida en su vehículo y adherida a la piel del animal tratado, puede mantener su residualidad.

DOSIS:

Aplicar 1 atomización por cada Kg. de peso. En caninos y equinos rociar sobre orejas, lomo y por debajo de las extremidades. En las aves rociar principalmente sobre el área ventral.

Repetir la aplicación cada 20 días, según la infestación existente.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

La toxicidad de este producto se limita a irritación de las mucosas, por lo que se debe evitar el contacto con los ojos.

Un muy bajo porcentaje de la población canina puede presentar hipersensibilidad dérmica al producto manifestándose al dejar de aplicar el producto.

Los felinos pueden manifestar sintomatología nerviosa (temores, incoordinación y pérdida de la conciencia) e incluso fallecer si no se proporciona atención médica. FORTE SPRAY no está indicado para esta especie animal.

La Permetrina es uno de los plaguicidas con grado de toxicidad más bajo para los animales de sangre caliente. Sin embargo, como todos los piretroides son muy nocivos para los animales de sangre fría (peces, reptiles, crustáceos, abejas y otros).

Se debe tener cuidado de no contaminar manantiales, abrevadero y lugares de agua corriente.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad al componente de la fórmula.

Para uso externo.

Evitar su uso en animales menores de 8 semanas de edad, enfermos o convalecientes.

No utilizar en felinos domésticos.

Evitar el contacto con los ojos y membranas mucosas.

Tiempo de retiro:

Aves productoras de carne y huevo: No requiere tiempo de retiro

No administrar a equinos destinados para consumo humano.

No se transporte y almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

No reutilizar el envase.

Depositar el envase en un lugar establecido oficialmente para su confinamiento o destrucción.

En caso de intoxicación: Si tiene contacto con los ojos: enjuague con abundante agua. Si tiene contacto con la piel: lave con abundante agua y jabón. En caso de ingestión: No inducir el vómito.

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.



Mederilab[®]

PRIMEROS AUXILIOS:

Dar atención médica inmediata.

Evitar contacto excesivo con el producto.

Lave con abundante agua y jabón las áreas de la piel y mucosa que hayan estado en contacto directo con el producto.

Mantenga al paciente abrigado, en reposo y respirando aire fresco.

Si ha habido ingestión del producto y el paciente está consciente provoque el vómito.

Si aparecen signos nerviosos acelere la obtención de servicios médicos.

No se deberá dar leche o productos que contengan grasas.

PRESENTACIONES:

Frasco con 60 ml

Frasco con 120 ml

Frasco con 240 ml

**USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com