



MederiLab®

E-50

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-089

Tabletas

Antimicrobiano de amplio espectro

FÓRMULA:

Cada tableta contiene:

Enrofloxacin 50 mg

Excipiente c.b.p. 1 tableta

ESPECIES:



INDICACIONES:

Para el tratamiento de infecciones ocasionadas por bacterias y Micoplasmas sensibles a la fórmula, que causan enfermedades de las vías respiratorias, del tracto digestivo y genitourinario, así como en piel y oído.

MECANISMO DE ACCION:

Las fluorquinolonas inhiben la división celular, reducen la tasa de crecimiento bacteriano, inducen cambios en la ultraestructura de la superficie bacteriana que previene la colonización de tejidos específicos, interfiere en la expresión de factores de virulencia, y aumentan la susceptibilidad de algunos microorganismos a la fagocitosis.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

Tiene muy buena biodisponibilidad por vía oral. Su actividad bactericida depende de la concentración alcanzada, y la muerte de las bacterias susceptibles ocurre dentro de los 20 a 30 minutos de la exposición. Tiene una biodisponibilidad cercana al 100%. Alrededor del 27% está unido a las proteínas plasmáticas. Es eliminada del organismo principalmente por metabolismo hepático y excreción renal.

DOSIS:

1 tableta por cada 10 Kg. de peso cada 24 horas durante 5 días.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Oral.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Anormalidades cartilaginosas en animales jóvenes, alteraciones gástricas (vómitos, anorexia), elevación de las enzimas hepáticas, diarrea, ataxia, convulsiones, depresión/ letargia, vocalización y agresión.

INTERACCIONES:

Los productos que contienen cationes (Mg, Al, Ca) pueden unirse a la Enrofloxacin y evitar su absorción.

El hierro y zinc disminuyen la absorción de la Enrofloxacin.

La nitrofuratoína puede antagonizar su efecto.

Las fluorquinolonas potencializan la nefrotoxicidad de la ciclosporina.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad a los componentes de la fórmula.

No usar este producto en cachorros menores de 8 meses.

No administrarse preparados a base de aluminio o magnesio dentro de las dos horas posteriores a la toma de tabletas de Enrofloxacin. Ajustar la dosis en pacientes con deterioro de la función renal o hepática.

No se deje al alcance de los niños.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz.

Producto de uso exclusivo en Medicina Veterinaria.,

PRESENTACION:

Caja con 30 tabletas.

**USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. 01(33) 10 28 36 76
www.mederilab.com