



MederiLab®

FIPROMED SPRAY

NUMERO DE REGISTRO Q-1190-103

Spray
Ectoparasiticida

FÓRMULA:

Cada 100 ml contiene:

Fipronil 0.25 g
Vehículo c.b.p.....100 ml

ESPECIES:



INDICACIONES:

Indicado para el tratamiento, control y prevención de las infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides spp*, *Pulex irritans*), garrapatas (*Dermacentor spp* y *Rhipicephalus spp*), ácaros (*Otodectes cynotis*, *Chorioptes equi*), piojos (*Trichodectes canis*, *Linognathus setosus*, *Damalinia equi*) y moscas (*Dermatobia hominis*).

MECANISMO DE ACCION:

Actúa a nivel del SNC de los invertebrados, comportándose como inhibidor no selectivo del GABA. Al fijarse sobre su receptor situado en el interior del canal, inhibe el flujo intracelular del cloro. De esta manera, anula el efecto neuroregulador del GABA y provoca la rápida muerte del parásito por hiperexcitación.

El parásito sufre los efectos del fármaco al entrar en contacto con la piel y pelo tratado. La molécula de fipronil penetra rápidamente a través del exoesqueleto del parásito para alcanzar su punto de acción.

FARMACOCINETICA Y FARMACODINAMIA:

Se distribuye a través de la epidermis. El prolongado periodo de actividad residual después de la administración tópica es debido a su acumulación en los aceites de la piel y de los folículos pilosos de los animales tratados. Continúa liberándose durante cierto tiempo. Se disemina por todo el cuerpo aproximadamente en 24 horas por medio de la translocación. No se detecta en las capas hipodérmicas ni en el tejido adiposo, lo cual confirma el limitado ingreso percutáneo.

DOSIS:

Equinos: Aplicar 40 ml por cada 100 kg. de peso.
Caninos y felinos: Aplicar de 3 a 6 ml por kg. de peso.

10 atomizaciones dosifican 1 ml de producto. Rociar el producto a una distancia de 10 a 20 cm. Administrar mensualmente.

VIA DE ADMINISTRACIÓN:

Tópica.

TOXICIDAD Y EFECTOS ADVERSOS:

Es un compuesto poco tóxico.
Puede ocasionar irritación temporal en el sitio de administración, así como prurito local o alopecia.

ADVERTENCIAS:

No se administre a pacientes con hipersensibilidad al componente de la fórmula.

Para uso externo.

Evitar su uso en animales menores de 8 semanas de edad, enfermos o convalecientes.

Evitar el contacto con los ojos.

No se recomienda entre las 48 horas antes y las 24 horas después de la aplicación.

No se transporte y almacene junto a productos alimenticios, ropa o forrajes.

No deben exponerse ni manejar este producto las mujeres embarazadas, en lactación ni menores de 18 años.

Manténgase fuera del alcance de los niños y animales domésticos.

Consérvese en un lugar fresco, seco y protegido de la luz solar directa.

No reutilizar el envase. Destruyase.

Producto de uso exclusivo en medicina veterinaria.

PRESENTACIONES:

Frasco con 120 ml

Frasco con 240 ml

**USO VETERINARIO
CONSULTE AL MÉDICO VETERINARIO
SU VENTA REQUIERE RECETA MÉDICA**

Información de uso exclusivo para el Médico Veterinario

HECHO EN MÉXICO POR:
MEDERI LAB S.A.P.I. DE C.V.
Tel. (33) 10 28 36 76
www.mederilab.com